

University of Groningen

Over de descensus testicularum

Dijkstra, Berend Klaas Sietze

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1947

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Dijkstra, B. K. S. (1947). *Over de descensus testicularum: een theoretische en practische caasaal- en finaal-morphogenetische synthese*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I.

Het is juist(er) te spreken van descensus epididymium dan van descensus testiculorum.

II.

In tegenstelling met de gebruikelijke opvatting, dat het rectum als enig darmderivaat van de primitieve cloaca is te beschouwen, moet worden aangenomen, dat ook colon, coecum, processus vermiformis en het caudaal van het Meckel's divertikel gelegen deel van het ileum door afsnoering uit de cloaca ontstaan.

Kermanner, F. (1909): Missbildungen des Rumpfes. In: Schwalbe, E.: Morph. d. Missb. III, 1.

von Berenberg Gossler, H., (1913): Beiträge z. Entw. gesch. d. caudalen Darmabschnitte und des Urogenitalsystems des Menschen auf teratologischer Grundlage. Anat. Hefte 49.

Woerdeman, M. W. (1944): Aangeboren defect van den buikwand. Versl. Ned. Akad. v. Wetensch. Afd. Natuurk. 53.

Dijkstra, B. K. S. (1947): A case of schizosoma reflexum in man. Acta Neerl. Morphol.: ter perse.

III.

Schizosoma reflexum en uranoscopia zijn gevolgen van dezelfde noxe, die vroeg tijdens de ontwikkeling heeft ingewerkt op het lumbosacrale dan wel het cervico-thoracale deel van de wervelkolom.

Dijkstra, B. K. S. (1947): A case of schizosoma reflexum in man. Acta Neerl. Morph.: ter perse.

IV.

Het is nuttig uit prophylactische overwegingen aan patienten, lijdende aan polyarthritis rheumatica acuta recidivans, gedurende de wintermaanden geringe doses sulfadiazine toe te dienen.

Stroud, W. D. (1946): Yearbook of Pediatrics, 248—249.

V.

In verband met het feit, dat de bezinkingssnelheid der erythrocyten niet altijd een juist beeld geeft van de toestand van de lijder aan tuberculose, is het raadzaam ook de sublimaattiter van het serum te bepalen.

Fortuyn Droogleevers, J. (1946). De klinische waarde der sublimaattitratie van het serum bij longtuberculose, vergeleken met die der bloedbezinkingssnelheid. N. T. v. G. 90, 2, 407.

VI.

Het microscopisch onderzoek van het bronchiaalsecreet, verkregen door bronchoscopie, is een waardevol hulpmiddel bij de vroege diagnose van nieuwvormingen in de long.

Herbut, P. A. and Clerf, L. H. (1946): Bronchogenic carcinoma. J. A. M. A. 130, 15.

VII.

De chirurgische therapie van de retentio testis heeft ten aanzien van de functie van de testis slechts zin wanneer deze gecombineerd wordt met een hormoonkuur.

VIII.

De in Amerika toegepaste „generalised refrigeration” kan het lijden van carcinoompatienten aanzienlijk verlichten.

Smith, L. W. and Fay, T. (1939): Temperature factors in cancer and embryonal cellgrowth. J. A. M. A. 113, 653—660.

Smith, L. W. and Fay, T. (1941): Observations on human beings with cancer maintained at reduced temperatures of 75—90° F. In: Temperature, its measurement and control in science and industry. Reinhold, New-York.

IX.

Bij de operatieve behandeling van ernstige gevallen van het idiopathisch syndroom van Ménière verdient de extirpatie van de horizontale booggang de voorkeur boven het doorsnijden van de nervus vestibularis.

Cawthorne, T. E. (1943): The treatment of Ménière's disease. J. o. Lar. a. Otolary 58, 9.

X.

Zeeziekte kan gedurende twintig uren afdoende worden bestreden met de combinatie van 15 mg prostigmine en 0,5 tot 1 mg sulfas atropini.

W o l f, S. (1943): Relation of gastric function to nausea in man. J. o. Clin. Invest. **22**, 877—882.

XI.

Ter bestrijding van het optreden van barotraumata bij jachtvliegers is een onderzoek vooraf in decompressiekamers te verkiezen boven het invoeren van compressiecabines in de vliegtuigen.

XII.

In verband met Nederlands positie als zeevarende mogendheid is het gewenst, dat aan alle Universiteiten hier te lande de tropische geneeskunde wordt gedoceerd.